

へん そく がん めん 片側顔面けいれん


原因

- ・原因は神経血管症候群(動脈硬化をおこした脳動脈が蛇行して顔面神経に接触して刺激をしている)が多いです。
- ・顔面神経麻痺の後遺症、脳腫瘍、脳梗塞、多発性硬化症などが原因のこともあります。



症状

- ・片方の目と口がピクピクとけいれんします。
- ・うっとうしいうえに前が見づらくなります。
- ・中高年女性に多い。



似たような症状をおこす病気

- ・眼瞼けいれんやチックは両まぶたが勝手に閉じてしまう原因不明の病気で両目に起こります。
- ・脳腫瘍が原因であることがありますので頭部 MRI を撮影します。

治療法

1. 薬物療法;カルバマゼピン、クロナゼパム、バクロフェン、ガバペンチンなどを処方します。有効率は約 30%です。眠気、肝機能障害、アレルギーなどの副反応に注意します。
2. 手術(微小血管減圧術);顔面神経に接触する脳動脈をわきにずらす手術。有効率約 70%。手術後に顔面神経麻痺、めまい、難聴が起こることがあります。
3. ボツリヌス療法;痙攣する筋肉を麻痺させる注射です。高額ですが有効率は約 100%です。効果は 3 か月程度で切れるので年に 3,4 回注射する必要があります。注射が効きすぎると顔面麻痺が起こって結膜炎をおこすこともあります。数ヶ月間で治ります。

さいごにひとこと

- ・副反応が少なく、お財布に優しい治療から順次実施いたします。
- ・手術を行う場合は脳神経外科にご紹介いたします。

みやさきクリニック 宮崎秀健